

HANDOUT

Szemantikai értékrés Cantor édenkertjének égboltján - avagy mi az, amit megmentett Hilbert?

C: Geier János, 2009.09.18-23

Ld. még: http://www.geier.hu/Cantor/Cantor_rovid.htm

Az eredeti kissé kiegészítve és sajtóhibák javítva. 2009.10.06

Minden jog fenntartva. Ez az írás a szerző írásbeli beleegyezése nélkül nem másolható, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, sem részben, sem egészben.

Az oldal linkelhető.

Idézés esetén az irodalmi hivatkozások szabályainak betartása szigorú követelmény.

Ez az írás a [Ruzsa Imre emlékkonferencián](http://phil.elte.hu/ruzsaconf/) (<http://phil.elte.hu/ruzsaconf/>) 2009.09.18.-án elhangzott 20 perces előadásom (+10 perc hozzászólás), valamint az 5 nappal későbbi [Filozófiai Szemináriumon](http://phil.elte.hu/tpf/) (<http://phil.elte.hu/tpf/>) 2009.09.23.-án elhangzott 1 órás (+fél óra diskusszió) előadásom alkalmával kiosztott Handout szövegével azonos, eltekintve néhány sajtóhiba javításától.

A Filozófiai Szemináriumra beküldött [absztraktot](http://phil.elte.hu/tpf/2009-2010/September/#5) itt <http://phil.elte.hu/tpf/2009-2010/September/#5> találod.

A Cantor tétel

Tétel: (Cantor hatványhalmaz tétele) *Tetszőleges nemüres M halmaz nem ekvivalens a $H=2^M$ hatványhalmazával.*

Bizonyítás: (a jól ismert tankönyvi verziók rekonstrukciója)

Tegyük fel indirekte, hogy M ekvivalens H-val, azaz, hogy

(1) létezik **B**: $M \rightarrow H$ bijektív leképezés.

Tekintsük a H hatványhalmaznak azt a T elemét, melynek pontosan azok az M halmazbeli x elemek elemei, melyekhez rendelt **B**(x) halmaz nem tartalmazza elemként x-et, azaz $T \in H$ tegyen eleget a

(2) $\forall x \in M [x \in T \Leftrightarrow \neg x \in \mathbf{B}(x)]$

követelménynek (\Leftrightarrow az 'ekvivalencia' logikai műveletet, \neg a 'negáció' logikai műveletet jelöli. $\Leftrightarrow \neg$ helyett a 'kizáró vagy' ∇ jelet is használhatjuk itt.)

Az (1) feltétel miatt létezik $t = \mathbf{B}^{-1}(T)$, azaz

(3) $\exists t \in T [\mathbf{B}(t) = T]$.

A (2) és (3) kétszeri felhasználásával kapjuk:

(4) ha $[t \in T]$ akkor $[t \notin \mathbf{B}(t)]$ azaz $[t \notin T]$, és ha $[t \notin T]$ akkor $[t \in \mathbf{B}(t)]$ azaz $[t \in T]$.

Ez ellentmondás, amivel

(*) cáfoltuk a kiinduló (1) indirekt feltételezésünket.

QED.

Erre a továbbiakban 'Cantor levezetés' elnevezéssel hivatkozunk.

* * *

Állítás: Ez a levezetés hibás, nem bizonyítja a konklúzióknak szánt állítást, azaz (1) tagadását. A hiba lényege: nem bizonyított, hogy a (2) követelményt kielégítő T halmaz szükségképpen létezik. Sőt ennek fordítottja igaz: amikor a levezetés során eljutunk (2)-ig, már ott bizonyítható (anélkül, hogy hivatkoznánk

a levezetés folytatására!), hogy az (1) feltétel fennállása mellett a (2) követelményt kielégítő $T \in H$ nem létezik. Emiatt a (3) és a (4) -ben lévő kifejezések értelmezhetetlenek, ezért a levezetésben nem lehet eljutni a (4) ellentmondás kimutatásáig.

A következőkben ∇ a 'kizáró vagy' logikai művelet jele, \cong a formulahelyettesítés metanyelvi jele.

Definíció: Legyen $U \subseteq V$ és R az (U, V) páron értelmezett reláció. Az R relációból származtatott diagonalizációs tulajdonságot a következő formulával definiálom:

$$D(v) \cong \forall x \in U [R(x, x) \nabla R(x, v)], \quad v \in V.$$

Tétel (Diagonalizációs tétel): Legyen $U=V$. Akkor az R -ből származtatott diagonalizációs tulajdonság kielégíthetetlen a V halmazon, azaz tetszőleges $v \in V$ -re $D(v) = \mathbf{h}$, azaz $\forall v \in V [\neg D(v)]$.

Biz: Legyen $e \in V$ tetszőleges rögzített elem. A $\Phi_e(x) \cong [R(x, x) \nabla R(x, e)]$ kifejezésben elvégezve a $x = e$ helyettesítést, a 'kizáró vagy' logikai művelet igazságtáblázata alapján kapjuk, hogy $\Phi_e(e) = \mathbf{h}$. Tehát létezik olyan $x \in V$, melyre $\Phi_e(x) = \mathbf{h}$, ezért hamis (\mathbf{h}) az az állítás, hogy $\Phi_e(x)$ minden $x \in V$ -re \mathbf{i} , azaz $[\forall x \in V \Phi_e(x)] = \mathbf{h}$, azaz $D(e) = \mathbf{h}$.

Mivel e -t tetszőlegesen választottuk, ezzel a tételt bebizonyítottuk. QED.

Megjegyzés: Ez nem indirekt bizonyítás.

Tétel_2: A

(1') $[\text{létezik } \mathbf{B}: M \rightarrow H \text{ bijektív leképezés }]$

feltétel fennállásakor nem létezik a (2) követelménynek eleget tévő $T \in H$
 azaz nem létezik olyan $T \in H$, melyre

(2') $\forall x \in M [x \in T \nabla x \in \mathbf{B}(x)]$

Bizonyítás:

Egyelőre használjunk ki annyit, hogy \mathbf{B} injektív és jelöljük \mathbf{B} képterét K -val, $K \subseteq H$.

Bevezetve a $X = \mathbf{B}(x)$ jelölést (ahol $x \in M$), (2) ezzel ekvivalens:

(5) $\forall X \in K [\mathbf{B}^{-1}(X) \in T \nabla \mathbf{B}^{-1}(X) \in X]; T \in H.$

Definiáljuk az $R(X, Y)$ relációt így:

(6) $R(X, Y) \cong [\mathbf{B}^{-1}(X) \in Y]; \quad X \in K, Y \in H.$

Ezt felhasználva (5) ezzel ekvivalens:

(7) $\forall X \in K [R(X, T) \nabla R(X, X)]; \quad T \in H.$

Látható, hogy (7) nem más, mint a (6)-ban definiált R relációból származtatott $D(T)$ diagonalizációs tulajdonság és ez ekvivalens (2) -vel.

Az (1) feltétel azzal ekvivalens, hogy létezik olyan *injektív* $\mathbf{B}: M \rightarrow H$ leképezés, mely egyben *szürjektív* is, azaz $K=H$. Ez megfelel a Diagonalizációs tétel $U=V$ feltételének, így a Diagonalizációs tétel alkalmazásával kapjuk, hogy minden $T \in H$ -ra $D(T) = \mathbf{h}$.

Tehát (1) fennállásakor nem létezik a (2) követelménynek eleget tévő $T \in H$. QED.

Következmény: A Cantor levezetése elakad a (2) pontnál, mivel azon túl egy addigra bizonyítottan nem létező T objektumra hivatkozik. Azt, hogy ilyen T nincs, a kiinduló indirekt feltételekre támaszkodva, de a

(2) ponton túli folytatástól független, önálló gondolatmenettel vezettem le. Mivel a Cantor levezetés az ellentmondás kimutatása előtt elakad, ezért ez egy hibás levezetés.

Kapcsolat a ZFC részhalmaz axióma sémájával. Wolfram szerint (eredeti betűjelek kissé átalakítva):

$$\forall M \forall p \exists T \forall x (x \in T \Leftrightarrow (x \in M \ \& \ \varphi(x;p)))$$

azaz: ha φ egy tulajdonság (p paraméterrel), akkor tetszőleges M halmaz és p paraméter esetén létezik az a $T = \{x \in M \mid \varphi(x;p)\}$ halmaz, mely az M halmaznak pontosan azokat az x elemeit tartalmazza, melyeknek rendelkeznek a φ tulajdonsággal.

Alkalmazás a Cantor levezetésre. Legyen: $p \equiv \mathbf{B}$, (\mathbf{B} az (1) szerinti) és $\varphi(x;p) \equiv \neg(x \in \mathbf{B}(x))$

akkor $\forall M \forall \mathbf{B} \exists T \forall x (x \in T \Leftrightarrow (x \in M \ \& \ \neg(x \in \mathbf{B}(x))))$

Azaz e konkrét axióma azt állítja, hogy tetszőleges M halmaz és bijektív $\mathbf{B}: M \rightarrow H$ leképezés esetén létezik a H hatványhalmaznak az a T eleme, melyre

(**) $\forall x \in M (x \in T \Leftrightarrow \neg(x \in \mathbf{B}(x)))$.

A (**) azonos a (2) követelménnyel. Tehát a ZFC részhalmaz axióma sémája alapján egy olyan konkrét axiómát állítottunk elő, mely pontosan az ellenkezőjét állítja annak, amit a Diagonalizációs tétel alkalmazása állít a Cantor levezetésre (ld. Tétel_2). Ez ellentmondás, amiből úgy (is) ki lehet kerülni, hogy tagadjuk a \mathbf{B} bijektivitását. Ezzel a formális segédlettel tehát a Cantor hatványhalmaz tétel a ZFC-ben bizonyítható. Ez elgondolkodtató!

C: Geier János, www.geier.hu, janos@geier.hu

Minden jog fenntartva